



## ONDERACTIVATIE

### Neurofeedback stimuleren beta1 en/of inhibitie theta

**LET OP: beta1 niet stimuleren bij gebruik  
methylfenidaat, Ritalin, Concerta enz.**

1. Wat is de klacht?
  - Concentratieproblemen (40 sessies)
  - Impulsief (40 sessies)
  - Vastgestelde diagnose ADHD en/of ASS (40 sessies)
  - Versterker op zintuigen, HSP (40 sessies)
  - Moeheid (30 sessies)



## REMMING

### Neurofeedback inhibitie alpha


1. Is er sprake van een asymmetrie links?  
(NFB inhibitie alpha links 40 sessies)
2. Wat is de klacht?
  - Depressie (40 sessies)
  - Vermoeidheid (40 sessies)
  - Burn-out (40 sessies)
  - Concentratieproblemen (40 sessies)



## OVERACTIVATIE

### Neurofeedback inhibitie beta2

1. Is er sprake van een asymmetrie rechts?  
(NFB inhibitie beta2 rechts 40 sessies)
2. Wat is de klacht?
  - Stress (20 sessies)
  - Angst (40 sessies)
  - Vermoeidheid (20 sessies)
  - Burn-out (30 sessies)
  - Concentratieproblemen (20 sessies)
  - Impulsief / ADHD / druk hoofd (40 sessies)



## ONDER- EN OVERACTIVATIE

### Neurofeedback inhibitie theta

1. Wat is de klacht?
  - Concentratieproblemen (40 sessies)
  - Impulsief (40 sessies)
  - Vastgestelde diagnose ADHD en/of ASS (40 sessies)
  - Versterker op zintuigen, HSP (40 sessies)